CORRELACIÓN DE LOS CAMBIOS MORFOMÉTRICOS EN RIÑÓN Y MÉDULA ÓSEA EN CANINOS INFECTADOS NATURALMENTE CON *Leishmania* sp.

CORRELATION OF THE MORPHOMETRIC CHANGES IN KIDNEY AND BONE MARROW IN DOGS NATURALLY INFECTED WITH *Leishmania* sp

Paola S¹, Avalos A¹, Maidana L¹, Suarez M¹, Marecos E¹, Oreggioni G²

1 Universidad Nacional de Asunción - Facultad de Ciencias Veterinarias - Departamento de Ciencias Patológicas - San Lorenzo - Paraguay

2 Tesista de Grado para optar al título de Doctor en Ciencias Veterinarias - Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de Asunción

RESUMEN. La glomerulonefritis de tipo mesangioproliferativa y/o membranoproliferativa; así como los cambios en médula ósea que contribuye al desarrollo de anemia severa asociada a trombocitopenia, es comúnmente observada en animales con leishmaniasis visceral canina (LVC). El objetivo fue determinar la relación de los cambios morfométricos macro y microscópicos del riñón y médula ósea (MO) con el número de amastigotes de *Leishmania* sp/mm² en MO. Se evaluaron 47 canes de diferentes edades y sexos, infectados naturalmente con *Leishmania* sp; que fueron agrupados según el número de *Leishmania* sp/mm² en MO como: carga baja, moderadamente baja, moderadamente alta y alta. Los parámetros morfométricos macroscópicos medidos en riñón fueron: longitud del riñón; anchura de riñón y espesor del riñón; los microscópicos: número de glomérulos renales/mm²; diámetro de glomérulos renales en corteza; espesor de la cápsula Bowman del riñón y porcentaje de tejido conjuntivo en riñón y en médula ósea: el porcentaje de tejido hematopoyético y estroma. Se observó una significativa diferencia entre los grupos según el número de amastigotes de *Leishmania* sp en MO/mm² ($p = 0.0002$). No se observó relación entre los parámetros morfométricos macro y microscópicos del riñón y MO con la carga parasitaria ($R^2 = 0.06$). Estos resultados indican una amplia magnitud de lesiones macro y microscópicas en riñón y MO en perros con LVC independiente del número de *Leishmania* sp/mm² en MO.

Palabras clave: Leishmaniasis visceral canina, cambios morfométricos, riñón, médula ósea, carga parasitaria, *Leishmania* sp, caninos

ABSTRACT. Mesangioproliferative or membranoproliferative glomerulonephritis; as the changes in bone marrow, which contributes to the development of severe anemia associated with thrombocytopenia are observed in animals with leishmaniasis canine visceral (LCV). The aim was to determine the relation between morphometric macroscopic and microscopic changes of kidney and bone marrow (BM) with the number of amastigotes of *Leishmania* sp in BM. Forty-seven dogs of different ages and sexes, naturally infected with *Leishmania* sp were evaluated and grouped according to the number of *Leishmania* sp/mm² in BM: low load, moderately low load, moderately high load and high load. Macroscopic morphometric parameters were measured in kidney: length, width and thickness; microscopic parameter: number of glomeruli in kidney/mm², diameter of glomeruli in cortex, Bowman capsule thickness and percentage of stroma; and in bone marrow: the percentage of hematopoietic tissue and stroma. A significant difference was observed between the groups according to the number of amastigotes of *Leishmania* sp/mm² BM ($p = 0.0002$). No relationship between the macro and microscopic morphometric parameters kidney and BM with parasite load ($R^2 = 0.06$). These results suggest a wide magnitude of macro and microscopic lesions in kidney and BM in dogs with LVC are an independent of the number of *Leishmania* sp/mm² BM.

Keywords: Canine Leishmaniasis, morphometry changes, kidney, bone marrow, parasite load, *Leishmania* sp, dog

doi: 10.18004/compend.cienc.vet.2016.06.01.11-16

Dirección para correspondencia: Prof. Dra. Shyrley Paola Amarilla - Departamento de Ciencias Patológicas - Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional de Asunción - Casilla de Correo N° 1061 - Ruta Mcal. Estigarribia Km 10,5- Campus Universitario - San Lorenzo- Paraguay

E-Mail: ashyrleypaola@yahoo.com

Recibido: 02 de mayo 2016 / **Aceptado:** 09 de mayo de 2016

INTRODUCCIÓN

La Leishmaniasis visceral canina (LVC) es considerada una zoonosis importante con una patogenia compleja, transmitida por un vector biológico del género *Lutzomyia* (América) y *Phlebotomus* (Viejo Mundo) (1). Está ampliamente distribuida en todos los continentes a excepción de Oceanía. En América del Sur, la prevalencia de *Leishmania* sp en los perros puede variar ampliamente, reportándose cifras desde 25% hasta de 75% (2). En Paraguay, el 45% de los canes son serológicamente positivos y son considerados como principal reservorio de la enfermedad (3).

El resultado de la infestación varía dependiendo del vector, el parásito y el huésped (4,5). En pacientes susceptibles a la enfermedad, el agotamiento de los linfocitos T en los órganos linfoides, se compensa con proliferación excesiva de linfocitos B, posteriormente activadas a células plasmáticas, así como proliferación de histiocitos y macrófagos. Este fenómeno puede explicar la linfadenomegalia, esplenomegalia e hiperglobulinemia policlonal consideradas características clínicas típicas en canes con LVC (5). Por otra parte la hiperglobulinemia no es protectora, sino perjudicial, con una acción directa o indirecta con generación de auto-anticuerpos, anticuerpos anti-histona, y/o complejos inmunes circulantes generados en cantidades considerables que serán depositados en diversos tejidos y órganos (6,7). Las principales alteraciones orgánicas observadas en LVC son patologías dérmicas, renales, oculares y sanguíneas.

En ocasiones la enfermedad renal es la única alteración clínica observada y la principal causa de muerte en canes con este padecimiento (8). Los estudios histopatológicos de los riñones de pacientes con LVC casi siempre revelan glomerulonefritis, tipo mesangioproliferativas y/o membranoproliferativas y nefritis tubulointersticial; mientras que la amiloidosis es rara de observar. (9,10). Las lesiones túbulos intersticiales son secundarias a la lesión glomerular, inflamación mediada por complejos inmunes y fibrosis renal. (11). Mientras que el depósito de inmuno-complejo es el principal mecanismo para la inducción de la glomerulonefritis, la inflamación granulomatosa caracterizada por una infiltración y proliferación de macrófagos, histiocitos, linfocitos y células plasmáticas, es la principal

responsable de las alteraciones histológicas observadas en otros órganos como ser linfonódulos, bazo, hígado, intestinos y médula ósea (MO) (5). En la MO, el número de amastigotes suele ser alto y la inflamación granulomatosa va asociada a la hiperplasia eritroide linfoplasmocítica, una hipoplasia y/o displasia megacariocítica, un aumento de la relación mieloide/eritroide y eritrofagocitosis, que en conjunto contribuyen al desarrollo de una anemia severa con frecuencia asociada a trombocitopenia (12). Además, el establecimiento de la anemia en pacientes con leishmaniasis canina se ve favorecida por el daño renal, considerando que el riñón es el sitio principal de producción de la hormona eritropoyetina, la cual es responsable de la formación de eritocitos.

Todos los estudios referenciados describen los cambios microscópicos renales y en MO de animales que padecen leishmaniasis canina; dichas evaluaciones están enfocadas a observaciones descriptivas e independientes; sin la asociación entre ambos órganos y/o correlación de las alteraciones con la cantidad de parásitos; por lo que el presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación de los cambios morfométricos macro y microscópicos del riñón y médula ósea con el número de amastigotes de *Leishmania* sp en MO en canes infectados naturalmente con Leishmaniasis visceral canina.

MATERIALES Y MÉTODOS

Animales y muestras

Fueron analizadas un total de 47 muestras de riñón y 47 muestras de médula ósea obtenidos de canes serológica y citológicamente positivos a LVC, sin distinción de edad, raza y sexo, procedentes del Hospital Veterinario "Prof. Dr. José Vicente Núñez", del Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional (CAN) y clínicas veterinarias privadas del Departamento Central-Paraguay. Dichos animales fueron eutanasiados humanitariamente con una sobredosis de tiopental sódico (BIOSANO S.A.) vía endovenosa (250 mg/kg) y sometidos a necropsia en el Departamento de Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias-UNA, previa autorización firmada por los propietarios. A la necropsia, los animales fueron pesados y se obtuvieron frotis de médula ósea, que se fijaron con

metanol p.a. (Biopack, Argentina), luego se realizó la evaluación de los parámetros macroscópicos y finalmente se obtuvieron fragmentos de ambos riñones que incluyeron corteza y médula renal; además, médula ósea procedente de estérnebra que fueron fijadas en solución bufferada de formaldehído al 10% (Lasca, Paraguay).

Morfometría macroscópica renal. Parámetros:

1. Peso del animal y riñones, en gramos
2. Longitud, anchura y espesor de riñones, cm
3. Longitud de médula y corteza, al corte transversal en cm

Citología e histopatología

Los frotis de médula ósea fueron teñidos con una solución bufferada de Giemsa al 5% (Biopack, Argentina) durante 30 min y lavados con agua corriente hasta eliminar el exceso de colorante. Los fragmentos de tejido renal y médula ósea fueron procesados mediante la técnica histológica de rutina, cortados a 4 micras y teñidos con hematoxilina y eosina (H&E). El tricómico de Masson (Biopack, Argentina) se utilizó para la identificación de tejido conjuntivo denso en el intersticio renal.

Para la cuantificación citológica de la carga parasitaria en médula ósea y formación de grupos de estudio, el número de amastigotes de *Leishmania* sp independiente a su localización intra y/o extracelular en las muestras citológicas de MO fueron valoradas en 40 campos consecutivos no superpuestos con objetivo de 0,2 mm². La conformación de los grupos se realizó mediante la utilización de los estadísticos: mediana, mínima, máxima y cuartiles 1 y 3. Tabla 1.

Morfometría microscópica renal

La medición microscópica de los riñones se realizó en 25 campos consecutivos no superpuestos de 0,05 mm² evaluados mediante la utilización del software de imagen, Imagen J (Version 1.49 23 June 2015. The Research Services Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA).

Parámetros:

1. Espesor de la capsula de Bowman, en μm .
2. Número de glomérulos y diámetros, en número ordinales y μm respectivamente.

3. Estroma intersticial renal con tinción tricómico de Masson, en porcentaje de área.

Morfometría microscópica de la MO

Se realizaron en campos de 0,02 mm² consecutivos no superpuestos, valorados con el software de imagen Imagen J (Versión 1.49 23 June 2015. The Research Services Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland, USA).

Parámetros:

1. Tejido hematopoyético, en μm^2 .
2. Tejido de sostén, en porcentaje.

Valoración de los resultados

Los resultados obtenidos se expresaron en mediana con desvío estándar ($Mn \pm SD$). Todas las mediciones realizadas fueron analizadas mediante el software estadístico GraphPad Prism5 (San Diego, California. USA), utilizando los test estadísticos Kruskal-Wallis y el Mann Whitney. El análisis comparativo se realizó entre cada grupo de estudio: carga baja, moderadamente baja, moderadamente alta y alta, con los parámetros macro y microscópicos del riñón y médula ósea. Los resultados fueron considerados estadísticamente significativos cuando p presentó un valor $p < 0.05$. Para determinar la relación existente entre las variables en estudio se utilizó el Coeficiente de Regresión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Cuantificación citológica de la carga parasitaria en médula ósea

Con relación al número de amastigotes de *Leishmania* sp. independiente a su localización intra y/o extracelular en MO/mm², los caninos infectados se agruparon en 4 categorías. Figura y Tabla 1. Los categorizados como de baja carga, se constituyeron por siete caninos. Clínicamente uno fue considerado asintomático y seis oligosintomáticos. El segundo grupo, con carga moderadamente baja representado por 13 caninos; uno asintomático, diez oligosintomáticos y dos sintomáticos. El tercer grupo categorizado como moderadamente-alta fueron 13 canes, uno asintomático, once oligosintomáticos y uno sintomático y el grupo con alta carga con 13 caninos, dos asintomáticos, ocho oligosintomáticos y tres sintomáticos.

Figura 1. Citologías de médula ósea de canes: A: grupo de baja carga. B: grupo de moderada-baja carga. C: grupo moderada-alta carga. D: grupo de alta carga parasitaria. Tinción Giemsa. Amastigotes de *Leishmania* sp de localización intracelular especialmente en macrófagos (flecha amarilla) y otras de localización extracelular (flecha negra).

Tabla 1. Distribución en categorías de los animales en estudio según el número de amastigotes de *Leishmania* sp de localización intra y extracelular en MO/mm²

Categorías	Números de amastigotes <i>Leishmania</i> sp. en médula Ósea por mm ²	Símbolos	Grados	Valor de p
Negativo	0	0	0	-
Baja	01 - 07	+	1	0.002
Moderada-baja	08 - 16	++	2	0.002
Moderada-alta	17 - 130	+++	3	0.002
Alta	131 - 1980	+++++	4	0.002

La virulencia del parásito y la respuesta inmunológica del hospedador son los que determinan la presencia o la ausencia de signos clínicos existiendo así portadores asintomáticos y sintomáticos (14,15). Aunque exista una buena correlación entre la intensidad de la reacción inflamatoria, la carga parasitaria y el estatus clínico de la enfermedad (16); en este estudio se observó una amplia variabilidad de síntomas, sin que las mismas se correlacionen con la carga parasitaria.

Morfometría macroscópica renal

El peso del tejido renal con relación al peso corporal y la relación corteza/médula en las diversas categorías en estudio: carga baja, moderadamente-baja, moderadamente-alta y alta; así como los parámetros morfométricos macro y microscópicos evaluados en dicho órgano, según las categorías en estudio, no son estadísticamente significativas cuando se comparan entre sí. Aunque, los animales categorizados como de alta carga parasitaria en MO presentaron las menores medianas de los parámetros macroscópicos. Figura 2 y Gráfico 1.

Figura 2. Riñones de canes: A y B: grupo de baja carga. C y D: grupo de moderada-baja carga. E y F: grupo moderada-alta carga. G y H: grupo de alta carga parasitaria. Todos los riñones a excepción del grupo de alta carga con una coloración normal de tonalidad variada y superficie lisa. Al corte transversal todos con una relación corteza/médula normal: 1:2 y los riñones del grupo moderada-alto con estriaciones blanquecinas corticales y el grupo de alta carga con calcificación próxima a la cresta renal.

Gráfico 1. Distribución del número caninos con LVC según sus manifestaciones clínicas y categorías. San Lorenzo, Paraguay 2015.

Morfometría microscópica renal y de médula ósea

Con relación a los valores microscópicos correspondientes a los caninos del grupo de alta carga, presentaron menor número de glomérulos por mm^2 en corteza renal, con aumento del diámetro de los mismos, del espesor de la Cápsula de Bowman, y del porcentaje de tejido conjuntivo renal. Los resultados demostraron que, cuando menor fue el número de glomérulos por mm^2 en corteza renal, mayor fue el diámetro de los mismos, atribuible a un fenómeno de adaptación/compensación fisiológica del órgano para el proceso de función glomerular del plasma sanguíneo Figura 3.

Figura 3. Cortes histológicos: Riñón de canes. Fila 1.a a 5.a: H&E. Fila 2.b a 5.b: Tricromico de Masson. Médula ósea de canes. Fila 1.c a 5.c: H&E. Correspondiente a animales del grupo de alta carga parasitaria. Glomérulos renales (*), diámetro (-), infiltrado inflamatorio (flecha roja), tejido conjuntivo color azul (flecha blanca), tejido hemopoyético (flecha negra) y tejido adiposo (flecha amarilla). Se observa en este grupos como ejemplo del estudio que los riñones y medula ósea presentan variados cambios morfométricos.

Si bien, no existe diferencia estadística significativa entre los porcentajes de mediciones morfométricas en MO entre las categorías: carga baja, moderadamente-baja, moderadamente-alta y alta; las medianas de la categoría de alta carga parasitaria

presentó el menor porcentaje de tejido hematopoyético en MO. Gráfico 2.

Gráfico 2. Medianas y Desvío Estándar de los parámetros morfométricos macroscópicos (Longitud: L/Anchura: A/Espesor: E) del riñón en los diferentes grupos en estudios. San Lorenzo, Paraguay 2015.

Estos hallazgos no se registran de manera constante entre sí, al evaluar en todas las categorías en estudio, quizás sea debido a una respuesta inmune Th1 / Th2 mixta, la cual da lugar a daños tisulares a través de diferentes mecanismos patológicos, como ser: reacciones inflamatorias granulomatosa, deposición de inmunes complejos, y/o la producción de autoanticuerpos. Este es un mecanismo de compensación, aunque perjudicial generado principalmente por la incapacidad de los macrófagos para eliminar al parásito en animales susceptible. (6)

Cuando se relaciona la carga parasitaria con los parámetros morfométricos del riñón y médula ósea en todos los animales en estudio no se observó relación. Tabla 2 y 3.

Tabla 2. Parámetros morfométricos macroscópicos en riñón		R ²
Longitud del riñón		= 0.0198
Anchura del riñón		= 0.0003
Espesor del riñón		= 0.0005
Parámetros morfométricos microscópicos en riñón		R ²
Número de glomérulos por mm^2 en riñón		= 0.0144
Diámetro de glomérulos en corteza renal		= 0.0644
Espesor de la cápsula Bowman del riñón		= 0.0103
Porcentaje de tejido conjuntivo en riñón		= 0.01617
Tabla 3. Parámetros morfométricos microscópicos en médula ósea		R ²
Tejido hematopoyético		= 0.0108
Estroma		= 0.0108

Llamativamente, se pudo observar que:

* Cuando aumenta el número de *Leishmania* sp en MO/ mm^2 disminuye la longitud de los riñones. Este fenómeno se distinguió claramente en los animales que conforman el grupo de baja y alta carga parasitaria.

* Cuando aumentó el número de *Leishmania* sp MO/ mm^2 en los animales en estudio, aumentó el diámetro de los glomérulos renales, con una

disminución del número por mm^2 . Además se observó un aumento del porcentaje de tejido conjuntivo renal y el espesor de la capsula de Bowman. Si se relacionan los parámetros del grupo de baja carga se observa una tendencia más pronunciada al aumento del espesor de la capsula de Bowman, acompañado de una disminución del diámetro de los glomérulos.

* Mientras que en el grupo de moderadamente-baja carga, se observó una fuerte tendencia entre el aumento del porcentaje de tejido conjuntivo renal y el número de *Leishmania* sp en MO/mm^2 .

* Por último, si se relacionan los parámetros morfométricos de MO, en los animales considerados de baja carga se observa una tendencia a disminuir el tejido hematopoyético y aumenta el estroma en dicho órgano.

CONCLUSIÓN.

Estos resultados demuestran una amplia variabilidad de manifestaciones clínicas, diversidad y magnitud de lesiones macro y microscópicas en riñón y MO en animales infectados naturalmente con *Leishmania* sp; además, la falta de asociación entre el número de amastigotes de *Leishmania* sp/ mm^2 en MO y estas lesiones.

No se descarta la posibilidad de que exista asociación cuando se evalúen los parámetros morfométricos del riñón con el número de *Leishmania* sp presente en este órgano y/o cuando se asocie con el tipo y cantidad de infiltrado inflamatorio del intersticio renal. Con relación a la MO, a pesar de realizar asociación entre parámetros morfométricos y el número de *Leishmania* sp/ mm^2 , tampoco se descarta una relación positiva y/o negativa cuando se cuantifiquen líneas celulares, como ser la mieloidea y eritroidea; por lo que estudio sobre estos puntos serían adecuado para mejor entendimiento de la patogenia de la enfermedad.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a la Sra. Emi por su contribución técnica en el laboratorio; a los profesionales del Hospital de la Facultad de Ciencias Veterinarias "Prof. Dr. José Vicente Núñez", del Centro Antirrábico Nacional (CAN) y clínicas veterinarias privadas por su apoyo en la derivación de los

pacientes al Dpto. de Ciencias Patológicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias-UNA.

BIBLIOGRAFÍA

1. Marselle R, Gopegui R R. Leishmaniasis: a re-emerging zoonosis. *Int J Dermatol* (USA). 1998; 37(11):801-14.
2. Dantas-Torres F, Solano-Gallego L, Baneth G, Ribeiro VM, De Paiva-Cavalcanti M, Otranto D. 2012. Canine Leishmaniasis in the Old and New Worlds: unveiled similarities and differences. *Trends Parasitol*. 2012 Dec;28(12):531-8.
3. Organización Panamericana de La Salud. Consulta de expertos OPS/OMS sobre leishmaniasis visceral en las Américas. Brasil : OPS; 2005. 149 p.
4. Marolo M, Pennisi M G, Di Muccio T, Khoury C, Gradoni L, Gramiccia M. Infection of sandflies by a cat naturally infected with *Leishmania infantum*. *Vet Parasitol* (USA). 2007; 145 (3-4): 357-360.
5. Koutinas AF, Koutinas CK. Pathologic Mechanisms Underlying the Clinical Findings in Canine Leishmaniasis due to *Leishmania infantum*/chagasi. *Vet Pathol* (USA). 2014; 51(2): 527-530.
6. López R, Lucena R, Novales M, Ginel PJ, Martin E, Molleda JM. 1996. Circulating immune complexes and renal function in canine leishmaniasis. *Zentralbl Veterinarmed B*. 1996; 43(8):469-74.
7. Ginel PJ, Camacho S, Lucena R. 2008. Anti-histone antibodies in dogs with leishmaniasis and glomerulonephritis. *Res VetSci* (USA); 85(3):510-4.
8. Costa FAL, Goto HL, Saldanha CBS, Silva MMSI, Sinhorini I; Silva L. et al. Histopathologic Patterns of Nephropathy in Naturally Acquired Canine Visceral Leishmaniasis. *Vet Pathol* (USA). 2003; 40(6): 677-684.
9. Aresu L, Rastaldi MP, Pregel P, Valenza F, Radaelli E, Scanziani E, Castagnaro M. Dog as model for down-expression of E-cadherin and beta-catenin in tubular epithelial cells in renal fibrosis. *Virchows Arch*. 2013; 453(6):617-25.
10. Costa F, Uerra JL, Silva S, Klein RP, Mendonça IL, Goto H. CD4+ T cells participate in the nephropathy of canine visceral Leishmaniasis. *Braz J Med Biol Res* (SP) 2010; 33 (12): 1455-1458.
11. Zatelli A, Borgarelli M, Santilli R, Bonfanti U, Nigrisoli E, Zanatta R. Glomerular lesions in dogs infected with *Leishmania* organisms. *Am J Vet Res* (USA). 2003; 64(5) : 558-61
12. Foglia Manzillo V, Restucci B, Pagano A, Gradoni L, Oliva G. Pathological changes in the bone marrow of dogs with Leishmaniasis. *Vet Rec* (Lon). 2006; 20;158(20):690-4.
13. Cabassu JP, Gervais P, Seguret N. Manifestations cliniques de la leishmaniose canine. *Prat. Med. Chir. Anim. Com*. 1988; 21 : 85-92.
14. Ferrer LM. Clinical aspects of canine leishmaniasis. In. Killick-kendrick R, editor. *Canine Leishmaniasis: An update. Proceedings of the International Canine Leishmania Forum Barcelona, Spain. Barcelona : Hoechst Roussel Vet; 1999. p. 6-10.*
15. Diniz SA, Melo MS, Borges AM, Bueno R, Reis BP, Tafuri WL, Nascimento EF, Santos RL. Genital lesions associated with visceral leishmaniasis and shedding of *Leishmania* sp. in the semen of naturally infected dogs. *Vet Pathol* (USA). 2005; 42 : 650-658.